



# Régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami Aménagement du réservoir Pikauba

## Végétation terrestre

- Peuplement résineux**
  - Pessière noire
  - Sapinière
  - Pinède grise
  - Mélèzin
  - Peuplement résineux en régénération
- Peuplement mélangé**
  - Peuplement mélangé à dominance résineuse
  - Peuplement mélangé à dominance feuillue
  - Peuplement mélangé en régénération
- Peuplement feuillu**
  - Bétulaie blanche
  - Bétulaie jaune
  - Peuplement faux-tremble
  - Cerisaie de Pennsylvanie
  - Peuplement feuillu en régénération
- Autre**
  - Plantation
  - Coupe totale ou épidémie grave
  - Brûlis
  - Dénudé sec
  - Défriché (emprise de transport d'énergie, route)
  - Autres (construit, gravière)
- Milieu humide**
  - Bog
  - Fen
  - Marécage (végétation arbustive)
  - Marais (végétation herbacée)
  - Eaux peu profondes (herbier)
- Hydrographie**
  - Route principale
  - Ligne de transport

Sources :

Projection Transverse (MTM), zone 7  
 Surface de référence : ellipsoïde GRS 1980  
 Datum Nord-Américain 1983 (NAD83)

Carte de base : BDTQ au 1 : 20 000  
 Limite du réservoir projeté : BDTA au 1 : 20 000

Interprétation des milieux humides réalisée à partir des photographies aériennes 1 : 15 000 prises en automne 2000 par Hydro-Québec, travail réalisé par Foramec inc.

Décembre 2001 0 1,5 3 km

