

Tableaux des inventaires de la faune aviaire

Annexe D Tableaux des inventaires de la faune aviaire

Tableau 1 **Nombres et densités observés chez les oiseaux nicheurs associés aux milieux ouverts d'origine agricole, juin 2005**

espèce	nombres rapportés		densité (/ 10 ha)	
	individus	couples	individus	couples
Bruant chanteur	7	6,0	17,8	15,3
Carouge à épaulettes	5	3,5	12,7	8,9
Moucherolle des aulnes**	3	3,0	7,6	7,6
Paruline masquée**	3	3,0	7,6	7,6
Bruant des prés*	3	3,0	7,6	7,6
Chardonneret jaune	10	3,0	25,5	7,6
Goglu des prés**	2	2,0	5,1	5,1
Tyran tritri**	2	1,0	5,1	2,5
Jaseur d'Amérique	2	1,0	5,1	2,5
Paruline jaune**	1	1,0	2,5	2,5
Paruline à flancs marron**	1	1,0	2,5	2,5
Paruline des ruisseaux**	1	1,0	2,5	2,5
Total	40	28,5	101,9	72,6

Nombre de points d'écoute :	5	Longueur totale traversés (m) :	19136
Espèces directement touchées :	12	Largeur moy. de l'emprise (m) :	23
Superficie inventoriée (ha) :	3,9	Superf. d'habitat touchée (ha) :	44,0

* espèce observée seulement dans les champs agricoles ** espèces observées seulement dans les friches.

Tableau 2**Nombres et densités observés chez les oiseaux nicheurs associés aux plantations, juin 2005**

espèce	nombres rapportés		densité (/ 10 ha)	
	individus	couples	individus	couples
Bruant chanteur	5	4,5	15,9	14,3
Moucherolle des aulnes	4	4,0	12,7	12,7
Bruant des prés	4	4,0	12,7	12,7
Merle d'Amérique	3	3,0	9,5	9,5
Chardonneret jaune	6	3,0	19,1	9,5
Paruline jaune	2	2,0	6,4	6,4
Paruline masquée	2	2,0	6,4	6,4
Bruant à gorge blanche	2	2,0	6,4	6,4
Vacher à tête brune	3	1,5	9,5	4,8
Viréo aux yeux rouges	1	1,0	3,2	3,2
Paruline flamboyante	1	1,0	3,2	3,2
Roselin pourpré	1	1,0	3,2	3,2
Hirondelle bicolore	1	0,5	3,2	1,6
Mésange à tête noire	2	0,5	6,4	1,6
Total	37	30,0	117,8	95,5

Nombre de points d'écoute :	4	Longueur totale traversés (m) :	1079
Espèces directement touchées :	14	Largeur moy. de l'emprise (m) :	23
Superficie inventoriée (ha) :	3,1	Superficie touchée (ha) :	2,48

Tableau 3**Nombres et densités observés chez les oiseaux nicheurs associés aux forêts en régénération, juin 2005**

espèce	nombres rapportés		densité (/ 10 ha)	
	individus	couples	individus	couples
Bruant à gorge blanche	8	7,0	20,4	17,8
Paruline masquée	5	5,0	12,7	12,7
Paruline à joues grises	4	4,0	10,2	10,2
Paruline à tête cendrée	4	4,0	10,2	10,2
Moucherolle des aulnes	3	3,0	7,6	7,6
Roitelet à couronne rubis	3	3,0	7,6	7,6
Paruline à flancs marron	3	3,0	7,6	7,6
Paruline à couronne rousse	2	2,0	5,1	5,1
Chardonneret jaune	4	2,0	10,2	5,1
Roselin pourpré	2	1,5	5,1	3,8
Viréo à tête bleue	1	1,0	2,5	2,5
Viréo de Philadelphie	1	1,0	2,5	2,5
Sittelle à poitrine rousse	1	0,5	2,5	1,3
Merle d'Amérique	1	1,0	2,5	2,5
Jaseur d'Amérique	1	0,5	2,5	1,3
Paruline à croupion jaune	1	1,0	2,5	2,5
Paruline à gorge noire	1	1,0	2,5	2,5
Paruline noir et blanc	1	1,0	2,5	2,5
Paruline triste	1	1,0	2,5	2,5
Paruline du Canada	1	1,0	2,5	2,5
Cardinal à poitrine rose	1	1,0	2,5	2,5
Total	49	44,5	124,8	113,3

Nombre de points d'écoute :	5	Longueur totale traversés (m) :	2586
Espèces directement touchées :	21	Largeur moy. de l'emprise (m) :	23
Superficie inventoriée (ha) :	3,9	Superficie touchée (ha) :	5,95

Tableau 4

**Nombres et densités observés chez les oiseaux nicheurs
associés aux jeunes forêts mixtes, juin 2005**

espèce	nombres rapportés		densité (/ 10 ha)	
	individus	couples	individus	couples
Merle d'Amérique	15	8,5	11,9	6,8
Viréo aux yeux rouges	8	8,0	6,4	6,4
Bruant à gorge blanche	10	7,5	8,0	6,0
Mésange à tête noire	12	6,5	9,5	5,2
Grive fauve	7	6,5	5,6	5,2
Paruline couronnée	6	6,0	4,8	4,8
Paruline à gorge noire	5	5,0	4,0	4,0
Geai bleu	7	4,0	5,6	3,2
Paruline bleue	4	4,0	3,2	3,2
Pic maculé	3	3,0	2,4	2,4
Paruline à joues grises	3	3,0	2,4	2,4
Paruline masquée	3	3,0	2,4	2,4
Roitelet à couronne dorée	3	2,5	2,4	2,0
Chardonneret jaune	4	2,5	3,2	2,0
Viréo de Philadelphie	3	2,0	2,4	1,6
Sittelle à poitrine rousse	2	2,0	1,6	1,6
Grimpereau brun	2	2,0	1,6	1,6
Grive solitaire	2	2,0	1,6	1,6
Paruline à tête cendrée	2	2,0	1,6	1,6
Paruline noir et blanc	3	2,0	2,4	1,6
Paruline triste	1	2,0	0,8	1,6
Bruant chanteur	2	2,0	1,6	1,6
Corneille d'Amérique	3	1,5	2,4	1,2
Vacher à tête brune	3	1,5	2,4	1,2
Autour des palombes	2	1,0	1,6	0,8
Chevalier grivelé	1	1,0	0,8	0,8
Pic chevelu	1	1,0	0,8	0,8
Pic flamboyant	1	1,0	0,8	0,8
Pioui de l'Est	1	1,0	0,8	0,8
Moucherolle des aulnes	1	1,0	0,8	0,8
Tyran huppé	1	1,0	0,8	0,8
Sittelle à poitrine blanche	1	1,0	0,8	0,8
Troglodyte mignon	1	1,0	0,8	0,8
Roitelet à couronne rubis	1	1,0	0,8	0,8
Paruline jaune	1	1,0	0,8	0,8
Paruline à flancs marron	1	1,0	0,8	0,8
Paruline tigrée	1	1,0	0,8	0,8
Paruline à croupion jaune	1	1,0	0,8	0,8
Paruline flamboyante	2	1,0	1,6	0,8
Carouge à épaulettes	2	1,0	1,6	0,8
Roselin pourpré	1	1,0	0,8	0,8
Jaseur d'Amérique	1	0,5	0,8	0,4
Total	134	106,5	106,6	84,8

Nombre de points d'écoute :	16	Longueur totale traversés (m) :	8293
Espèces directement touchées :	42	Largeur moy. de l'emprise (m) :	23
Superficie inventoriée (ha) :	12,6	Superficie touchée (ha) :	19,07

Tableau 5

**Nombres et densités observés chez les oiseaux nicheurs
associés aux forêts mixtes matures, juin 2005**

espèce	nombres rapportés		densité (/ 10 ha)	
	individus	couples	individus	couples
Bruant à gorge blanche	8	7,0	10,2	8,9
Mésange à tête noire	8	5,5	10,2	7,0
Grive fauve	5	5,0	6,4	6,4
Paruline à tête cendrée	5	5,0	6,4	6,4
Grive solitaire	3	3,0	3,8	3,8
Paruline à joues grises	3	3,0	3,8	3,8
Merle d'Amérique	3	2,5	3,8	3,2
Jaseur d'Amérique	3	2,5	3,8	3,2
Chardonneret jaune	4	2,5	5,1	3,2
Geai bleu	5	2,0	6,4	2,5
Grimpereau brun	2	2,0	2,5	2,5
Paruline à gorge noire	2	2,0	2,5	2,5
Bruant chanteur	2	2,0	2,5	2,5
Pic mineur	1	1,0	1,3	1,3
Pic chevelu	1	1,0	1,3	1,3
Tyran huppé	1	1,0	1,3	1,3
Viréo à tête bleue	1	1,0	1,3	1,3
Viréo de Philadelphie	1	1,0	1,3	1,3
Viréo aux yeux rouges	1	1,0	1,3	1,3
Roitelet à couronne rubis	1	1,0	1,3	1,3
Paruline à flancs marron	1	1,0	1,3	1,3
Paruline bleue	1	1,0	1,3	1,3
Paruline à croupion jaune	2	1,0	2,5	1,3
Paruline à gorge orangée	1	1,0	1,3	1,3
Paruline à couronne rousse	1	1,0	1,3	1,3
Paruline noir et blanc	1	1,0	1,3	1,3
Paruline flamboyante	1	1,0	1,3	1,3
Paruline couronnée	1	1,0	1,3	1,3
Paruline masquée	1	1,0	1,3	1,3
Paruline du Canada	1	1,0	1,3	1,3
Vacher à tête brune	2	1,0	2,5	1,3
Oriole de Baltimore	1	1,0	1,3	1,3
Roselin pourpré	2	1,0	2,5	1,3
Quiscale bronzé	2	0,5	2,5	0,6
Total	78	64,5	99,3	82,1

Nombre de points d'écoute :	10	Longueur totale traversés (m) :	1985
Espèces directement touchées :	34	Largeur moy. de l'emprise (m) :	23
Superficie inventoriée (ha) :	7,9	Superficie touchée (ha) :	4,57

Tableau 6

**Nombres et densités observés chez les oiseaux nicheurs
associés aux forêts de résineux, juin 2005**

espèce	nombres rapportés		densité (/ 10 ha)	
	individus	couples	individus	couples
Bruant à gorge blanche	13	9,0	18,4	12,7
Paruline à joues grises	6	6,0	8,5	8,5
Paruline à croupion jaune	5	5,0	7,1	7,1
Roitelet à couronne rubis	4	4,0	5,7	5,7
Grive solitaire	3	3,0	4,2	4,2
Paruline masquée	4	3,0	5,7	4,2
Geai bleu	3	2,5	4,2	3,5
Grimpereau brun	4	2,5	5,7	3,5
Roitelet à couronne dorée	2	2,0	2,8	2,8
Paruline à tête cendrée	2	2,0	2,8	2,8
Paruline couronnée	2	2,0	2,8	2,8
Pic chevelu	2	1,0	2,8	1,4
Viréo à tête bleue	1	1,0	1,4	1,4
Sittelle à poitrine rousse	1	1,0	1,4	1,4
Merle d'Amérique	1	1,0	1,4	1,4
Paruline à couronne rousse	1	1,0	1,4	1,4
Paruline noir et blanc	1	1,0	1,4	1,4
Paruline flamboyante	1	1,0	1,4	1,4
Bruant familial	1	1,0	1,4	1,4
Bruant de Lincoln	1	1,0	1,4	1,4
Roselin pourpré	1	1,0	1,4	1,4
Vacher à tête brune	1	0,5	1,4	0,7
Total	60	51,5	84,9	72,9

Nombre de points d'écoute :	9	Longueur totale traversés (m) :	5947
Espèces directement touchées :	22	Largeur moy. de l'emprise (m) :	23
Superficie inventoriée (ha) :	7,1	Superficie touchée (ha) :	13,7

Tableau 7

**Nombres et densités observés chez les oiseaux nicheurs
associés aux tourbières, juin 2005**

espèce	nombres rapportés		densité (/ 10 ha)	
	individus	couples	individus	couples
Paruline masquée	16	15,0	14,6	13,6
Bruant à gorge blanche	13	12,0	11,8	10,9
Paruline à couronne rousse	11	11,0	10,0	10,0
Paruline à joues grises	7	7,0	6,4	6,4
Paruline à croupion jaune	9	7,0	8,2	6,4
Bruant de Lincoln	7	6,0	6,4	5,5
Chardonneret jaune	9	6,0	8,2	5,5
Paruline à tête cendrée	5	5,0	4,5	4,5
Roselin pourpré	5	4,0	4,5	3,6
Bruant chanteur	5	3,5	4,5	3,2
Grive solitaire	3	3,0	2,7	2,7
Moucherolle à ventre jaune	2	2,0	1,8	1,8
Roitelet à couronne dorée	2	2,0	1,8	1,8
Roitelet à couronne rubis	2	2,0	1,8	1,8
Jaseur d'Amérique	5	2,0	4,5	1,8
Paruline à flancs marron	2	2,0	1,8	1,8
Mésange à tête noire	3	1,5	2,7	1,4
Paruline noir et blanc	2	1,5	1,8	1,4
Viréo aux yeux rouges	1	1,0	0,9	0,9
Mésangeai du Canada	1	1,0	0,9	0,9
Sittelle à poitrine rousse	1	1,0	0,9	0,9
Merle d'Amérique	1	1,0	0,9	0,9
Paruline jaune	1	1,0	0,9	0,9
Paruline à poitrine baie	1	1,0	0,9	0,9
Paruline couronnée	1	1,0	0,9	0,9
Paruline à calotte noire	1	1,0	0,9	0,9
Vacher à tête brune	2	1,0	1,8	0,9
Busard Saint-Martin	1	0,5	0,9	0,5
Colibri à gorge rubis	1	0,5	0,9	0,5
Total	120	102,5	109,1	93,2

Nombre de points d'écoute :	14	Longueur totale traversés (m) :	739
Espèces directement touchées :	29	Largeur moy. de l'emprise (m) :	23
Superficie inventoriée (ha) :	11,0	Superficie touchée (ha) :	1,7

