

## **Annexe 9**

### **Espèces d'oiseaux rencontrées dans la zone d'étude**



**Annexe 9a. Liste des oiseaux susceptibles de fréquenter la zone d'étude (Gauthier et Aubry 1995)**

Nom français	Nom latin	Nicheur confirmé	Nicheur probable	Nicheur possible
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>			x
<b>Famille : Parulidés</b>				
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>		x	
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>			x
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>		x	
Paruline tigrée	<i>Dendroica tigrina</i>			x
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>			x
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>		x	
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>			x
Paruline noir et blanc	<i>Mniotilta varia</i>			x
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>			x
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>			x
Paruline du Canada	<i>Wilsonia canadensis</i>	x		
<b>Famille : Embérizidés</b>				
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	x		
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>			x
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>		x	
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>			x
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	x		
<b>Famille : Fringillidés</b>				
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>		x	
Tarin des pins	<i>Carduelis pinus</i>			x
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>			x
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>		x	
<b>Famille : Passéridés</b>				
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>		x	

Source : Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. 1995. *Banque informatisée de données*. Association québécoise des groupes d'ornithologues, Société québécoise pour la protection des oiseaux, Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

Annexe 9a. Liste des oiseaux susceptibles de fréquenter la zone d'étude (Gauthier et Aubry 1995)

Nom français	Nom latin	Nicheur confirmé	Nicheur probable	Nicheur possible
Grand duc d'Amérique	<i>Bubo virginianus</i>			x
<b>Ordre : Coraciiformes</b>				
<b>Famille : Alcédinidés</b>				
Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Ceryle alcyon</i>			x
<b>Ordre : Piciformes</b>				
<b>Famille : Picidés</b>				
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>			x
<b>Ordre : Passéiformes</b>				
<b>Famille : Tyrannidés</b>				
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>			x
<b>Famille : Hirundinidés</b>				
Hirondelle bicolore	<i>Tachycineta bicolor</i>	x		
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	x		
<b>Famille : Corvidés</b>				
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>		x	
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	x		
<b>Famille : Paridés</b>				
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>			x
<b>Famille : Certhiidés</b>				
Grimpereau brun	<i>Certhia americana</i>			x
<b>Famille : Troglodytidés</b>				
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>			x
<b>Famille : Régulidés</b>				
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>			x
<b>Famille : Turdidés</b>				
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>		x	
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>			x
<b>Famille : Bombycillidés</b>				
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>		x	
<b>Famille : Sturnidés</b>				
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>		x	
<b>Famille : Viréonidés</b>				
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>			x

Annexe 9a. Liste des oiseaux susceptibles de fréquenter la zone d'étude (Gauthier et Aubry 1995)

Nom français	Nom latin	Nicheur confirmé	Nicheur probable	Nicheur possible
<b>Ordre : Péléciformes</b>				
<b>Famille : Phalacrocoracidae</b>				
Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>			x
<b>Ordre : Ciconiiformes</b>				
<b>Famille : Ardeidae</b>				
Grand héron	<i>Ardea herodias</i>			x
<b>Ordre : Asériformes</b>				
<b>Famille : Anatidae</b>				
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>			x
Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>			
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	x		
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>		x	
<b>Ordre : Falconiformes</b>				
<b>Famille : Accipitridae</b>				
Balibazard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>		x	
Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>			x
Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>		x	
<b>Ordre : Galliformes</b>				
<b>Famille : Phasianidae</b>				
Gélinotte huppée	<i>Bonasa umbellus</i>	x		
<b>Famille : Scolopacidae</b>				
Grand chevalier	<i>Tringa melanoleuca</i>			
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularia</i>			x
<b>Famille : Laridae</b>				
Mouette de Bonaparte	<i>Larus philadelphia</i>			
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>		x	
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>		x	
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>		x	
<b>Ordre : Columbiformes</b>				
<b>Famille : Columbidae</b>				
Tourterelle triste	<i>Zenaidura macroura</i>			x
<b>Ordre : Strigiformes</b>				
<b>Famille : Strigidae</b>				



## Annexe 9b. Liste des espèces recensées lors des inventaires sur le terrain

Espèce	Nom scientifique	Habitat de nidification <sup>1</sup>	Statut migratoire <sup>2</sup>	Fréquence (SBBE) <sup>3</sup>	Nidification <sup>4</sup>	Relevés terrain Densité <sup>5</sup> (Mâle/10 ha)
Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	Lacs	NM	68,4	Possible	Peu commun
Canard noir <sup>6</sup>	<i>Anas rubripes</i>	Cours d'eau	NM	57,9	Confirmée	2 femelles (7 petits)
Fuligule à collier <sup>6</sup>	<i>Aythya collaris</i>	Lacs, étangs	NM	38,2	Confirmée	1 couvée (6 petits)
Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	Milieux humides	NM	40,8	Possible	Peu commun
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>	Forêts mixtes	NR	65,8	Possible	Commun
Pic flamboyant	<i>Colaptes auratus</i>	Forêts clairsemées	NM	94,7	Possible	Peu commun
Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>	Forêts humides	NM	60,5	Possible	0,8
Moucherolle des aulnes	<i>Empidonax alnorum</i>	Arbustes	NM	89,5	Possible	0,8
Moucherolle tchébec	<i>Empidonax minimus</i>	Jeunes feuillus	NM	90,8	Possible	0,8
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	Falaises	NS	78,9	Possible	Peu commun
Mésange à tête noire	<i>Parus atricapillus</i>	Forêts feuillues, mixtes, urbaines	NR	92,1	Probable	1,6
Mésange à tête brune	<i>Parus hudsonicus</i>	Forêts résineuses	NR	80,3	Possible	0,8
Sittelle à poitrine rousse	<i>Sitta canadensis</i>	Forêts résineuses	NR	65,8	Possible	Commun
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Forêts	NM	97,4	Possible	2,4
Roitelet à couronne dorée	<i>Regulus satrapa</i>	Forêts résineuses fermées	NM	44,7	Possible	5,6
Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>	Forêts	NM	97,4	Possible	7,2
Grive fauve	<i>Catharus fuscescens</i>	Forêts feuillues et mixtes	NM	59,2	Possible	Peu commun
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	Forêts résineuses	NM	98,7	Probable	9,5
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>	À proximité de milieux ouverts	NM	98,7	Possible	Peu commun
Jaseur d'Amérique	<i>Bombcilla cedrorum</i>	Forêts	NM	100	Possible	3,2
Viréo à tête bleue	<i>Vireo solitarius</i>	Forêts mixtes et résineuses	NM	63,2	Probable	2,4
Viréo de Philadelphie	<i>Vireo philadelphicus</i>	Forêts feuillues et mixtes	NM	90,8	Probable	1,6
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>	Forêts feuillues et mixtes	NM	93,4	Possible	Commun
Paruline obscure	<i>Vermivora peregrina</i>	Forêts arbustives	NM	97,4	Possible	2,4
Paruline à joues grises	<i>Vermivora ruficapilla</i>	Forêts arbustives	NM	89,5	Possible	4,8
Paruline à tête cendrée	<i>Dendroica magnolia</i>	Forêts arbustives et matures	NM	100	Probable	11,9
Paruline à croupion jaune	<i>Dendroica coronata</i>	Forêts résineuses	NM	94,7	Possible	1,6
Paruline à gorge noire	<i>Dendroica virens</i>	Forêts mixtes et résineuses	NM	85,5	Probable	3,2
Paruline à gorge orangée	<i>Dendroica fusca</i>	Forêts mixtes et résineuses	NM	61,8	Probable	0,8
Paruline à poitrine baie	<i>Dendroica castanea</i>	Forêts mixtes et résineuses	NM	90,8	Confirmée	5,6
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>	Milieux riverains et ouverts	NM	97,4	Possible	Commun
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>	À proximité de milieux ouverts	NM	85,5	Probable	Peu commun
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>	Milieux riverains et ouverts	NM	69,7	Possible	Peu commun
Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>	Milieux riverains et ouverts	NM	93,4	Confirmée	0,8
Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>	Milieux riverains	NM	77,6	Possible	Commun
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Forêts ouvertes ou arbustives	NM	100	Probable	9,5
Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>	Forêts ouvertes	NM	98,7	Possible	Peu commun
Roselin pourpré	<i>Carpodacus purpureus</i>	Forêts mixtes	NM	100	Possible	Commun
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	Forêts mixtes et résineuses	NR	61,8	Possible	Commun
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>	À proximité de milieux ouverts	NM	56,6	Possible	Peu commun
Gros-bec errant	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	Forêts mixtes et résineuses	NR	100	Possible	Peu commun

1 : Habitat de prédilection pour la nidification (Gauthier et Aubry 1995)

2 : Selon (Gauthier et Aubry 1995)

3 : Fréquence de détection dans les parcelles dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc de l'est (Gauthier et Aubry 1995)

4 : Statut de nidification identifié lors des relevés terrain selon les critères de l'Atlas (Gauthier et Aubry 1995)

5 : Pour certaines espèces, la densité ne peut qu'être exprimée de façon qualitative puisque certaines espèces sont très mobiles et possèdent de grands domaines vitaux ou qu'elles ont été détectées à l'extérieur du rayon des stations d'écoute

6 : Dénombrement complet pour l'aire d'étude

