


Annexe 6

Lecture des transects

Les transects ont été élaborés afin de donner un aperçu des formes de terrain, des dépôts de surface et de la végétation de chaque unité écologique. Il s'agit d'un parcours linéaire qui a été déterminé en fonction des connaissances acquises lors de la validation des informations écologiques effectuée sur le terrain. La figure suivante indique les éléments servant à interpréter les informations qui figurent sur les schémas de transect de chaque unité écologique de la section 3 du présent document.




* Lorsque le groupement d'essences n'est pas connu

** Voir le lexique des codes de dépôts de surface à la page suivante

Note : l'information concernant la végétation constitue une généralisation illustrant le caractère dominant de la classe d'âge, du type de couvert ou du groupement d'essence.

Lexique des codes de dépôts de surface³⁷



Type de dépôt de surface

Dépôt d'origine glaciaire (mis en place directement par le glacier)

1a : till épais (> 0,5 m) indifférencié, sans morphologie

1aR : till mince (< 0,5 m) indifférencié, sans morphologie, sur socle rocheux cristallin

Dépôt d'origine fluvio-glaciaire (mis en place au contact ou à proximité du glacier par les eaux de fonte)

2ag : esker, sable et gravier (> 15 % de pierrosité)

2bg : plaine d'épandage, sable (> 15 % de pierrosité)

Dépôt d'origine glacio-lacustre (mis en place en milieu littoral et d'eau profonde des lacs Barlow et Ojibway)

4bl : limon et argile (dépôt en eau profonde)

4df : plage sub-actuelle, sable fin lacustre (< 15 % de pierrosité)

Dépôt organique (mis en place par entourage)

7a : tourbe mince (< 1 m) sur argile et limon

7p : tourbe épaisse (> 1 m)

7t : tourbe mince (< 1 m) sur till ou sable

Dépôt d'altération et de bas de pente (mis en place par la gravité)

8c(R) : colluvion mince (< 0,5 m) sur roc

Dépôt éolien (mis en place par le vent)

9b : dune fixée

Affleurements rocheux

R1 : affleurement cristallin et till

Drainage

1 : excessif

2-3 : bon à modérément bon (sol sec à frais)

4-5 : imparfait à mauvais (sol très frais à humide)

6 : très mauvais (sol saturé)

* : présence de *seepage* (mouvement laminaire d'un fluide, notamment de l'eau, dans un milieu poreux saturé. À la différence de l'infiltration, cet écoulement peut avoir une composante horizontale).

Classes de pente de terrain :

Pentes simples (surface régulière)

Pentes multiples (surface irrégulière)

Pente (%)

A : pentes nulles

a : unité faiblement ondulée

0 à 5

B : pentes faibles

b : unité fortement ondulée

5 à 10

C : pentes modérées

c : unité faiblement vallonnée

10 à 15

D : pentes fortes

d : unité fortement vallonnée

15 à 30

E : pentes très abruptes

e : unité accidentée

> 30

³⁷ Adapté du cadre écologique de référence de la MRC de La Vallée-de-l'Or réalisée par le MDDEP et de la cartographie écologique des MRC de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue réalisés par le MDDEP

Annexe 7

Lexique des formes de terrain³⁸

Basse colline : Dénivelé compris entre 100 et 200 mètres.

Button : Dénivelé compris entre 25 et 50 mètres.

Butte : Dénivelé compris entre 50 et 100 mètres.

Crête : Relief très allongé comportant une partie sommitale de grande convexité et des versants raides.

Cuvette : Dépression bien marquée, de forme plus ou moins régulière, dont les pentes latérales sont peu significatives.

Dépression : Étendue de terrain de forme généralement concave. Elle est dite structurale lorsqu'elle comporte au moins une zone d'écoulement vers l'extérieur, sans toutefois être une unité d'écoulement marqué. Elle est dite ouverte lorsqu'elle possède au moins une zone d'écoulement marqué vers l'extérieur. Elle est dite fermée lorsqu'il y a absence de zone d'écoulement marqué vers l'extérieur.

Escarpement : Versant rocheux à forte déclivité (> 100 %).

Fond de vallée : Partie de la vallée située de part et d'autre du cours d'eau à l'exclusion des versants.

Monticule : Dénivelé de moins de 25 mètres.

Plaine : Grande étendue plane de terrain.

Platière : Portion de territoire sans réseau d'écoulement, faisant la transition entre les reliefs marqués et les dépressions ou les plans d'eau.

Plateau : Portion de territoire de grande amplitude horizontale à subhorizontale, en position surélevée par rapport aux terrains environnants.

Ravin : Vallée étroite aux versants escarpés creusés dans du matériel meuble (argile, sable), dont la déclivité des versants est supérieure à 50 % et ayant un dénivelé de 5 à 50 mètres.

Replat : Portion de territoire (horizontale à subhorizontale) en position intermédiaire dans un versant.

Sommet : Partie supérieure d'une colline ou d'une butte.

Terrain : Portion de terrain sans forme bien définie.

Vallon : Petite vallée courte et peu profonde dont les versants sont peu prononcés et de faible déclivité (< 10 %).

Versant : Lien entre la partie sommitale des reliefs marqués et la partie inférieure (fond de vallées, dépressions).

³⁸ Comprend uniquement les termes utilisés dans le présent document.

Annexe 8 – Liste des espèces fauniques de l’Abitibi-Témiscamingue

Poissons

Achigan à petite bouche	Doré noir	Méné de lac	Omble de fontaine
Barbotte brune	Épinoche à cinq épines	Méné émeraude	Omisco
Chabot à tête plate	Épinoche à neuf épines	Méné jaune	Ouitouche
Chabot tacheté	Esturgeon jaune*	Méné pâle	Perchaude
Chabot visqueux	Fouille roche zébré	Meunier noir	Queue à tache noire
Chevalier blanc	Grand brochet	Meunier rouge	Raseux de terre noir
Chevalier rouge	Grand corégone	Moulac	Tête de boule
Cisco de lac*	Laquaiche argentée	Mulet à cornes	Touladi
Crapet de roche	Laquaiche aux yeux d’or	Mulet perlé	Truite arc-en-ciel
Crapet soleil	Lotte	Museau noir	Truite brune
Dard à ventre jaune	Malachigan	Naseux des rapides	Ventre citron
Doré jaune	Méné à nageoires rouges	Naseux noir	Ventre rouge du Nord

* Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Herpétofaune

<i>Urodèles (salamandres et tritons)</i>		
Necture tachetée	Salamandre à points bleus	Salamandre rayée
Salamandre à deux lignes	Salamandre maculée	Triton vert
<i>Anoures</i>		
Crapaud d’Amérique	Grenouille du nord	Ouaouaron
Grenouille des bois	Grenouille léopard	Rainette crucifère
Grenouille des marais*	Grenouille verte	
<i>Tortues</i>		
Chélydre serpentine	Tortue mouchetée*	Tortue peinte
Tortue des bois**		
<i>Serpents</i>		
Couleuvre à collier	Couleuvre rayée	Couleuvre verte
Couleuvre à ventre rouge		

* Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable ** Espèce vulnérable

Mammifères

Belette à longue queue	Coyote	Mouffette rayée	Rat surmulot
Belette pygmée*	Écureuil roux	Musaraigne arctique	Raton laveur
Campagnol à dos roux de Grapper	Grand polatouche	Musaraigne cendrée	Renard roux (argenté ou croisé)
Campagnol des champs	Grande musaraigne	Musaraigne fuligineuse*	Souris commune
Campagnol des rochers*	Hermine	Musaraigne palustre	Souris sauteuse des bois
Campagnol-lemming de Cooper*	Lièvre d’Amérique	Musaraigne pygmée*	Souris sauteuse des champs
Carcajou***	Loup	Orignal	Souris sylvestre
Caribou des bois **	Loutre de rivière	Ours noir	Tamia mineur
Castor	Lynx du Canada*	Pékan	Tamia rayé
Cerf de Virginie	Lynx roux*	Phénacomys d’Ungava	Taupe à queue velue
Condylure étoilé	Marmotte commune	Porc-épic d’Amérique	Vison d’Amérique
Cougar*	Martre d’Amérique	Rat musqué	
Chauve-souris argentée*	Chauve-souris pygmée	Chauve-souris nordique	Grande chauve-souris brune
Chauve-souris cendrée*	Chauve-souris rousse*		Petite chauve-souris brune

* Espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable ** Espèce vulnérable *** Espèce menacée

Oiseaux

Abondantes	Communes	Peu communes	Occasionnelles	Rares
Bruant à gorge blanche	Balbuzard pêcheur	Alouette hausse-col	Bécasseau minuscule	Aigle royal**
Bruant chanteur	Bécasse d'Amérique	Autour des palombes	Bécasseau sanderling	Barge hudsonienne
Bruant des prés	Bécassine des marais	Bec-croisé bifascié	Bécasseau semipalmé	Bécasseau à croupion blanc
Bruant familier	Bernache du Canada	Bernache cravant	Bécasseau variable	Bécasseau à poitrine cendrée
Carouge à épaulettes	Bruant à couronne blanche	Bruant de Le Conte	Bécassin roux	Bécasseau de Baird
Cornelle d'Amérique	Bruant de Lincoln	Buse à queue rousse	Bruant faune	Bécasseau maubèche
Étourneau sansonnet	Bruant des marais	Canard branchu	Bruant lapon	Bec-croisé des sapins
Gélinotte huppée	Bruant des neiges	Canard souchet	Bruant vespéral	Bihoreau gris
Goéland à bec cerclé	Bruant hudsonien	Cardinal à poitrine rose	Canard chipeau	Bruant de Nelson*
Grand héron	Busard Saint-Martin	Chevalier solitaire	Chouette lapone	Bruant des plaines
Grive à dos olive	Buse pattue	Chouette épervière	Coulicou à bec noir	Bruant noir et blanc
Grive fauve	Butor d'Amérique	Épervier brun	Foulque d'Amérique	Canard siffleur
Grive solitaire	Canard colvert	Faucon émerillon	Goéland bourgmestre	Cardinal rouge
Hirondelle bicolor	Canard d'Amérique	Fuligule milouinan	Goéland marin	Carouge à tête jaune
Hirondelle rustique	Canard noir	Grand chevalier	Grive à joues grises	Chouette rayée
Jaseur d'Amérique	Canard pilelet	Grand pic	Grue du Canada	Courlis corlieu
Merle d'Amérique	Chardonnet jaune	Grand-duc d'Amérique	Harle huppé	Engoulevent bois-pourri
Mésange à tête noire	Chevalier grivelé	Grèbe jougris	Lagopède des saules	Érismature rousse
Moucherolle des aulnes	Colibri à gorge rubis	Grimpereau brun	Martinet ramoneur	Faucon pèlerin**
Moucherolle tchébec	Cormoran à aigrettes	Guifette noire	Merle bleu de l'Est	Fuligule à dos blanc
Paruline à croupion jaune	Crécerelle d'Amérique	Harelde kakawi	Moqueur chat	Fuligule à tête rouge
Paruline à flancs marron	Durbec des sapins	Harfang des neiges	Moqueur polyglotte	Garrot d'Islande*
Paruline couronnée	Engoulevent d'Amérique	Harle couronné	Moucherolle à côtés olive	Grèbe esclavon***
Paruline flamboyante	Fuligule à collier	Hibou des marais*	Mouette de Bonaparte	Grive de Bicknell*
Paruline jaune	Garrot à œil d'or	Hirondelle à front blanc	Paruline rayée	Grive des bois
Paruline masquée	Geai bleu	Hirondelle de rivage	Pic tridactyle	Grue cendrée
Pic chevelu	Goéland argenté	Jaseur boréal	Râle de Virginie	Hibou moyen-duc
Pic flamboyant	Goglu des prés	Macreuse brune	Sitelle à poitrine blanche	Macreuse à front blanc
Pic mineur	Grand corbeau	Marouette de Caroline	Sizerin blanchâtre	Macreuse noire
Pigeon biset	Grand harle	Mésange à tête brune	Tangara écarlate	Maubèche des champs
Plongeon huard	Grèbe à bec bigarré	Moineau domestique	Tétras à queue fine	Milan du Mississipi
Pluvier kildir	Gros-bec errant	Moucherolle à ventre jaune	Tournepieuvre à collier	Moqueur roux
Roitelet à couronne rubis	Junco ardoisé	Paruline à couronne rousse	Tyran huppé	Moucherolle phébi
Quiscale bronzé	Martin-pêcheur d'Amérique	Paruline à gorge grise	Urubu à tête rouge	Nyctale de Tengmalm
Tétras du Canada	Mésangeai du Canada	Paruline à gorge orangée	Viréo mélodieux	Oie rieuse
Viréo aux yeux rouges	Paruline à calotte noire	Paruline à poitrine baie		Oriole de Baltimore
Viréo de Philadelphie	Paruline à gorge noire	Petit chevalier		Paruline à collier
	Paruline à joues grises	Oie des neiges		Paruline polyglotte
	Paruline à tête cendrée	Pic à dos noir		Paruline verdâtre
	Paruline bleue	Pie-grèche grise		Passerin indigo
	Paruline des ruisseaux	Pipit d'Amérique		Petite nyctale
	Paruline du Canada	Pygargue à tête blanche **		Phalarope de Wilson
	Paruline tigrée	Quiscale rouilleux		Plongeon catmarin
	Paruline noir et blanc	Roitelet à couronne dorée		Pluvier argenté
	Paruline obscure	Tourterelle triste		Pluvier bronzé
	Paruline triste	Vacher à tête brune		Pluvier semipalmé
	Petit fuligule	Viréo à tête bleue		Quiscale de Brewer
	Petit garrot			Râle jaune*
	Petite buse			Roselin familier
	Pic maculé			Sturnelle des prés
	Roselin pourpré			Troglodyte familier
	Sarcelle à ailes bleues			
	Sarcelle d'hiver			
	Sitelle à poitrine rousse			
	Sizerin flammé			
	Sterne pierregarin			
	Tarin des pins			
	Troglodyte mignon			
	Tyran tritri			