



Régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami Aménagement du réservoir Pikauba

Végétation terrestre

- Peuplement résineux**
 - Pessière noire
 - Sapinière
 - Pinède grise
 - Mélèzin
 - Peuplement résineux en régénération
- Peuplement mélangé**
 - Peuplement mélangé à dominance résineuse
 - Peuplement mélangé à dominance feuillue
 - Peuplement mélangé en régénération
- Peuplement feuillu**
 - Bétulaie blanche
 - Bétulaie jaune
 - Peuplement faux-tremble
 - Cerisaie de Pennsylvanie
 - Peuplement feuillu en régénération
- Autre**
 - Plantation
 - Coupe totale ou épidémie grave
 - Brûlis
 - Dénudé sec
 - Défriché (emprise de transport d'énergie, route)
 - Autres (construit, gravière)
- Milieu humide**
 - Bog
 - Fen
 - Marécage (végétation arbustive)
 - Marais (végétation herbacée)
 - Eaux peu profondes (herbier)
- Hydrographie**
 - Route principale
 - Ligne de transport

Sources :

Projection Transverse (MTM), zone 7
 Surface de référence : ellipsoïde GRS 1980
 Datum Nord-Américain 1983 (NAD83)

Carte de base : BDTQ au 1 : 20 000
 Limite du réservoir projeté : BDTA au 1 : 20 000

Interprétation des milieux humides réalisée à partir des photographies aériennes 1 : 15 000 prises en automne 2000 par Hydro-Québec, travail réalisé par Foramec inc.

Décembre 2001 0 1,5 3 km

