

Tableau 3.7

Espèces aviennes recensées dans la région à l'étude

Espèce	Code	Indice	Espèce	Code	Indice
Plongeon huard	P	Probable	Grive fauve	P	Probable
Butor d'Amérique	H	Possible	Grive solitaire	T	Probable
Grand Héron	P	Probable	Grive des bois	JE	Confirmé
Bernache du Canada	X	Observé	Merle d'Amérique	JE	Confirmé
Canard noir	P	Probable	Moqueur chat	X	Observé
Canard pilet	P	Probable	Moqueur roux	P	Probable
Canard souchet	P	Probable	Jaseur d'Amérique	AT	Confirmé
Harle huppé	P	Probable	Étourneau sansonnet	NO	Confirmé
Urubu à tête rouge	H	Possible	Viréo mélodieux	H	Possible
Busard Saint-Martin	P	Probable	Viréo aux yeux rouges	H	Possible
Épervier brun	H	Possible	Paruline à joues grises	H	Possible
Autour des palombes	P	Probable	Paruline jaune	NO	Confirmé
Buse à épaulettes	P	Probable	Paruline à flancs marron	P	Probable
Crécerelle d'Amérique	CN	Confirmé	Paruline à tête cendrée	H	Possible
Tétras du Canada	P	Probable	Paruline bleue	H	Possible
Gélinotte huppée	DD	Confirmé	Paruline à croupion jaune	JE	Confirmé
Pluvier kildir	JE	Confirmé	Paruline à gorge orangée	P	Probable
Chevalier grivelé	JE	Confirmé	Paruline des pins	H	Possible
Bécassine des marais	P	Probable	Paruline noir et blanc	P	Probable
Bécasse d'Amérique	JE	Confirmé	Paruline flamboyante	AT	Confirmé
Goéland à bec cerclé	H	Possible	Paruline couronnée	H	Possible
Tourterelle triste	JE	Confirmé	Paruline triste	P	Probable
Engoulevent d'Amérique	P	Probable	Paruline masquée	P	Probable
Martinet ramoneur	P	Probable	Paruline du Canada	P	Probable
Colibri à gorge rubis	JE	Confirmé	Tangara écarlate	T	Probable
Martin-pêcheur d'Amérique	JE	Confirmé	Cardinal à poitrine rose	H	Possible
Pic mineur	JE	Confirmé	Passerin indigo	JE	Confirmé
Pic chevelu	JE	Confirmé	Bruant familier	JE	Confirmé
Pic flamboyant	AT	Confirmé	Bruant vespéral	H	Possible
Grand Pic	H	Possible	Bruant des prés	H	Possible
Pioui de l'Est	P	Probable	Bruant chanteur	T	Probable
Moucherolle des aulnes	H	Possible	Bruant des marais	H	Possible
Moucherolle phébi	JE	Confirmé	Bruant à gorge blanche	JE	Confirmé
Tyrann tritri	JE	Confirmé	Junco ardoisé	P	Probable
Hirondelle bicolore	P	Probable	Goglu des prés	JE	Confirmé
Hirondelle de rivage	NO	Confirmé	Carouge à épaulettes	JE	Confirmé
Hirondelle à front blanc	H	Possible	Stumelle des prés	P	Probable
Hirondelle rustique	NJ	Confirmé	Quiscale rouilleux	H	Possible
Geai bleu	JE	Confirmé	Quiscale bronzé	AT	Confirmé
Cornelle d'Amérique	P	Probable	Vacher à tête brune	H	Possible
Grand Corbeau	JE	Confirmé	Oriole de Baltimore	JE	Confirmé
Mésange à tête noire	JE	Confirmé	Durbec des sapins	X	Observé
Sittelle à poitrine rousse	P	Probable	Roselin pourpré	JE	Confirmé
Sittelle à poitrine blanche	P	Probable	Bec-croisé bifascié	T	Probable
Grimpereau brun	P	Probable	Tarin des pins	P	Probable
Roitelet à couronne dorée	H	Possible	Chardonneret jaune	NO	Confirmé
Roitelet à couronne rubis	P	Probable	Gros-bec errant	P	Probable
Merlebleu de l'Est	JE	Confirmé	Moineau domestique	P	Probable

Explication des codes

Observé
X: Observation de l'espèce pendant sa période de nidification
Possible
H: Présence de l'espèce dans son habitat durant sa période de nidification
Probable
P: Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification
T: Comportement territorial (chants, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire deux journées différentes à sept jours ou plus d'intervalle
C: Comportement nuptial: parade, copulation ou échange de nourriture entre adultes
V: Visite d'un site de nidification probable
A: Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours
N: Transport de matériel de construction d'un nid par des troglodytes; forage d'une cavité par des pics
Confirmé
CN: Construction d'un nid ou transport de matériel (exception des troglodytes et des pics)
NU: Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'oeufs de la présente saison
AT: Adulte transportant de la nourriture (pour des jeunes) durant sa période de nidification
PH: Preuve physiologique (i.e. plaque incubatrice très vascularisée ou oeuf présent dans l'oviducte)
DD: Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage
NO: Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité)
FE: Adulte transportant un sac fécal
JE: Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances
NJ: Nid contenant des oeufs ou des jeunes (vus ou entendus)

Source: Atlas des oiseaux nicheurs du Québec.