

ANNEXE 2

Fiches description de l'habitat

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 13 juin 2007

Station 01

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau Ouv.	Musc.	Herba.		Arbu.		Arbo.		
										basse	haute	bas	moy.	haut	bas	haut
forêt ouverte	95%	5%	0	0	0	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Jeune forêt coniférienne
 { forêt pin blanche, 1 + 1 +
 bouleau blanc

4 temps
 - r.v.c.

SNC-LAVALLIN
 Recueil de données
 PROJET NO. 502017 0730
 NOM: Bicknell Grive
 CATÉGORIE: 3.2
 DISTRIBUTION
 P.V.

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 13 juin 2007 # Station 02

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
forêt mixte caducifolée	90%	10%	0	0	0	4	2	3	1	1	1	1	1	1	1	0	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- jeune régénération - Forêt mixte à dominante caducifolée.
 - { sapin baumier + fr
 - { bouleau blanc
- Chintonie - Sureau rouge
- Trille
- Marais chêne
- Tongère
- Framboisier

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 13 Jun 2007

Station 03

Habitat	Superficie (%)				Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
forêt mixte conifère	80%	20%	0	0	3	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. moda : Visibilité modale, 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- jeune régénération (2 à 3 m)
- { sapin baumier + + +
- { bouleau blanc
- { sardle
- ↳ qq grands sapins (12m)

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 13 juin 2007

Station 04

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
forêt mixte conifère	85%	15%	0	0	0	4	1	2	1	1	1	1	1	1	0	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt mixte dominante conifère - Boisé en régénération
- { sapin baumier + + + (2 à 6 m)
- { bouleau blanc

- fougère
- Clintonie Boréale
- Saule
- 4 Kump
- Ribes

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 13 juin 2007

Station 05

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
forêt mixte	95%	5%	0	0	5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

{ Sapin baumier +++ (2 à 6 m)
 { épicéa rouge
 { bouleau bl.

- diptère
 - 4 temp ps
 - diatomée

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 25 juin 2007

Station 76

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates										
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut	
																		Arbu. bas
100% 100%	85%	5%	0	0	10%	2/3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt coniférienne mature
- L1 - épicéa
- sapin baumier
- Clintonie
- oxalide
- 4 temps

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 25 juin 2007

Station 27

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
lisière	85%	5%	0	0	2/5	2	3	4	1	0	0	1	1	0	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

o lisière forêt mixte mature
 la régénération sapin baumier principalement
 épingle à sapin baumier +++
 - souches basses - quelques uns -

Chambouze
 - oxalide
 - triantale
 - quelques Ribes -

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 13 juin 2007

Station 08

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Lisière	35	15			0	4	4		1	1	1	1	1	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infes insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

Station dans strates pour voir à quel point
 + forest coniférienne dans souches
 SAC + H
 Bos +
 arbu sp. + - juvéniles
 lisière ouverte
 marais

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date:

Station 03

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
310 10				4%		3	4				1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• *Griseola* ...
 ↳ ...
 { - la ... blanc
 - Rubus

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 13 juin 2007

Station 10

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Lisière			0	0	90%	1	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Lisière de coupe, station en milieu ouvert (moyenne 20-50 m)
 100% de superficie feuillue
 100% de superficie ouverte
 100% de superficie feuillue
 100% de superficie ouverte
 100% de superficie feuillue
 100% de superficie ouverte

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 15 juin 2007

Station 11

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
milieu tombée	55%	0	30%	5%	10%	4/2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt d'épinette mature et tombée
- Epinette +++ (1 à 8-10m)
- Rife
- Thi du Labrador -
- plantes carnivores (voir photo)

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 15 juin 2007

Station 12

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
Sapinière mature	98%	2%	0	0	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Sapinière mature → épinette & sapin baumier

- 4 temps
- Distonic

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 15 juin 2007

Station 13

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
forêt mixte conifère	80%	0	0	0	20%	1/5	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• forêt conifère mature
 → Sapin, épicéa

Ribe

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 15 juin 2007

Station 14

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
lisière	40%	10%	0	0	50%	4	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Forêt mature à coupe forestière
- Epicéte à Sapin baumier
- bouleau blanc
- linéolé boreale
- Rubus -

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 15 juin 2007

Station 15

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Comif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Ouvet	60%	0	0	0	0%	4	3	4	1	0	0	0	0	0	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Coupe forestière
 - { Epinette
 - { Sapin baumier +++
 - { Bouleau blanc

- Rive
- 4 temps
- 1 marais
- Limoné

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 7 juillet 2007

Station 16

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
Forêt mixte	55%	30%	5%	0	10%	3/5	2	3	2	1	1	1	1	1	1	0

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération mixte à dominante coniférienne
- Surpien bannée ++
- épicéa
- bouleau blanc ++
- Ribes

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 17 Jun 2007

Station 17

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
										Arbu. bas	Herba. haute	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut		
forêt mixte conifère	85%	15%	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0			

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférienne, feuillu (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération forêt mixte à dominante conifère (1 à 3 m)
 - { Sapin banner +++
 - { bouleau blanc
- Linnaé boreale
- 4 temps
- Fongère
- Rubus
- oxalide

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 17 juin 2007

Station 18

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
mixte (conifère)	80%	20%	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1			

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération mixte dominante coniférienne (2 à 4 m)
- sapin baumier + +
- bouleau blanc +
- saule
- ribe
- linnaé
- fougère
- oxalide montagnard
- ruzantele

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 17 juin 2007

Station 19

Habitat	Superficie (%)				Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau					Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
conifère	75%	20%	0	0	5%	0/3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère),lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération mixte à dominante coniférienne (1 à 3m)
- Sapin baumier ++
- bouleau blanc ++
- Saule
- bouleau jaune
- vivipare
- Rubus sp

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 17 juin 2007

Station 20

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Humide marais		Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
	Conif.	Feuil.	Eau												
forêt mixte	30%	70%	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listère (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- régénération forêt mixte
 - { bouleau bl + + +
 - sapin baumier + +
 - Épinette
 - Tremble

- ribe
- Sureau rouge
- 4 temps
- triantale
- saule

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 19 juin 2007

Station 81

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Humide marais		Eau Ouv.						Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
	Conif.	Feuil.														
insigne	45%	15%	0	0	40%	1/4	0	4	2	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lièzière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Forêt mature + régénération (1 à 2 m)
- { - Sapin baumier
- Épinette rouge
- Bouleau bl
- Lemne' sordide.
- diogène hispide

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date:

13 June 2007

Station

22

Habitat	Superficie (%)				Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
bois	65%	15%	0	0	20%	1	1	3	1	1	1	0	0	0	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• *Regulus satrapa* de bonk... forêt mixte
 - *Sialia*
 - *Pipilo*
 - *Corvus*
 - *Parus*
 - *Merula*
 - *Rubus*

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 19 juin 2007

Station 122

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
150 150 150	5%	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1			

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

o Régénération conifère (1 a 1 m)
 { - Sapin bismarckien 1-2
 - épicéa rouge 1-1
 - bouleau blanc
 - lierre
 - Ribes
 - diogène brève

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 14 juin 2007

Station 24

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
	15%		0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	1			

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listère (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Regeneration de la zone de forêt en lisière (à l'ouest)
 - Pin
 - Spruce
 - Douglas

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 19 juin 2007

Station

25

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
50% conifère	55%	10%	5%	0	0	4/1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt conifère : x régénération
- Sapin baumier ++
- Épicéa rouge ++
- bouleau bl
- Pice
- Thé du Labrador
- h temps
- myrica hispida

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 26

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
visier.	0%	30%	0	0	0/4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

visier forêt conifère mature x défrichement (bord du lac Scotti)
 { - Epinette +
 - Sapin baumier +
 - bouleau blanc +
 - 4 temps

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 27

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Humide marais		Eau Ouv.						Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
	Conif.	Féuil.	Humide marais	Eau Ouv.												
Lisière	90%	10%	0	0	0/3	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- lisière : régénération
- bouleau blanc
- Epinette
- sapin baumée
- saule

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 28

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
lisière	55%	5%	0	0	40%	4	0	2	2	1	1	1	1	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• lisière, Forêt mahue x régénération
 { Sapin baumier + 1
 2 pinette +
 2 bouleau blanc
 - Ribes
 - Anemone 4 temps
 - Diastème

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 29

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
Forêt conifère	85%	5%	0	0	10%	2/3	2	1	?	0	1	1	0	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. modale : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt mixte
- Epinette (0 à 10m) ++
- Sapin baumier (2 à 5m) ++
- bouleau blanc
- saule
- Ribes
- Maianthe - diogène
- Liliacée - Clintonie
- Fougerie - Ribes

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 30

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
végétation feuillue	10%	90%	0	0	0	5/3	2	0	1	()	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

● Régénération forêt mixte à dominante feuillue

- Saules ++
- Tremble +
- bouleau blanc ++
- sapin baumier →

- tramboisier
- sphégre

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 30 juil 2007

Station 31

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
Regénération complète	60%	10%	10%	0	2/4	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Régénération forêt mixte dominante coniférienne.

{ Sapin commun
 Epine HE rouge
 - Bouleau blanc

- Maithime
 - Clématite
 - 4 Temps
 - Lichen
 - Chrysele hispide -
 - Saurier

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date:

14/05/2008

Station

Habitat	Superficie (%)					Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais		Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
<i>Forêt mod.</i>	<i>80%</i>	<i>0</i>	<i>5%</i>	<i>0</i>	<i>75%</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. modale : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

Grive de Bicknell - 14/05/2008
Forêt modale - 14/05/2008
1 station

Ribe

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 14 juin 2007

Station: 33

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Humide marais		Eau	Ouv.					Musc.	Herba.		Arbu.		Arbu.	Arbu.	Arbo.	Arbo.
	Conif.	Feuil.								haute	bas	moy.	haut				
forêt mixte conifère	45%	5%	0	0	30%	4/1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod : Visibilité modale. 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• forêt mixte à dominante conifère
 (espèce dominante)
 100% de surface +
 100% de surface
 - 100%
 - 100%
 - 100%

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: *Aijjuin 9007*

Station *34*

Habitat	Superficie (%)			Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
<i>forêt</i>	<i>45%</i>	<i>0</i>	<i>5%</i>	<i>0</i>	<i>50%</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infes insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

forêt conifère
forêt conifère + + + + +
forêt conifère + +
bonheur bl +
-
-
-

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 14 juin 2007

Station

35

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
épinéto mixte	95%	5%	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1	1	0	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Régénération forêt coniférienne

- Sapin Baumeier +++

- bouleau blanc

- épinette rouge

- Tremble (-)

Sureau

- Saule

- ribes

- 4 fois DS

- érombisation

- Chénopode

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 14 juin 2007

Station 36

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Feuil.		Humide marais						Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
	Conif.	Conif.	Conif.	Conif.														
forêt mixte	50%	50%	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0			

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- phase régénération - forêt mixte
- { sapin baumier ++
- { bouleau bl ++
- Saule
- F. ke
- Cornouiller 4 temps
- Linnee

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 16 juillet 2012

Station

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Forêt mixte	50%	30%	0	0	9/1	2	1										

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod : Pourcentage de superficie d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• *Hypericum* a fruit mixte (104m)
 }
 - Sup. bannière
 - 1 petite écorche
 - bondeau de

tige
 écorche
 - écorche
 - écorche

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 10/05/2017

Station

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
ouvert	30%	52%	12%	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

Répartition coniférienne
 { Superficie conif. 30%
 { Superficie feuill. 52%
 - seule

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 11 juin 2007

Station 39

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
bois feuillu	70%	0	0	0	2/3	2	3		1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbuscules basses (<0.5 m), arbuscules moyens (0.5 à 2 m), arbuscules hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

forêt mature & coupe fraîche -
 1 prairie (rouge) + 1

> pléiène
 - ovalade de montagne

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 3 juillet 2007

Station 40

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
lisière	15%	5%	0	0 / 4	0	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération (coupe à blanc)
 - ↳ quelques épinette → 10 m
 - ↳ sapin baumier (1 m)
 - bouleau blanc

rubus
 - saules
 4 temps
 mais en même
 (finivie)

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 2) juin 2007

Station 41

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Forêt (conifère)	55%	10%	5%	0	30%	0/4	2	2	1	1	0	1	1	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Forêt marne coniférienne, régénération
- sauv. - épine
- limon. boudé
- coronilles 4 temps
- 4- sapin bannière
- boutons blanc

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 21 juin 2007

Station 42

Habitat	Superficie (%)				Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.		Humide marais						Eau	Ouv.	Musc.	Herba.		Arbu.				
												basse	haute	bas	moy.	haut	bas	
forêt mixte	60%	40%	0	0	0	0	4	1	2	2	1	0	0	1	0	1	0	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. moda : Visibilité modale. 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération forêt mixte
- { - Bouleau blanc + +
- { - Sapin baumier + +

- Rubus
- Rubus

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 21 juin 2007

Station 43

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates													
	Conif.		Humide marais						Eau	Ouv.	Musc.	Herba.		Arbu.		Arbu.	Arbo.					
	Feuil.	95%	5%	0								0	0	basse	haute			bas	moy.	haut	bas	haut
forêt conifère		95%	5%	0	0	0				3/4	2	2			1	0	0	0	0	0	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Forêt conifère mature & régénération
 - épave
 - Sapin baumier
 - Bouleau blanc

- Ribes

- 4 temps

- Limnée locale

Maisanthème

Fougère

(illegible)

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 21 juin 2007

Station 44

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
forêt mixte	65%	25%	0	0	3/4	1	1	2	1	1	1	1	1	0		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• frégéarisation forêt mixte =
 {
 - Sapia bannière ++ +
 - L'arbre blanc ++
 - 1 pointe rouge
 - 1 Nam ble

Ribe
 Rubus
 Chrysothrix

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 15 juin 2007

Station 45

Habitat	Superficie (%)				Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut		
																	Arbo.	Arbo.
forêt mixte	50%	50%	0	0														

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- jeune régénération (1 à 3m)
- Epinette rouge + +
- Sapin baumier + +
- Bouabu. bl. + +
- Limnée boreale
- Lichen
- 4 Ferns
- diogone

→ quelques boulders + cerisiers tardifs

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 15 juin 2007

Station 46

Habitat	Superficie (%)					Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.		Humide marais		Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbo. haut
l'aire oupinie	80	20	0	0	0	0/2	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

{ - Sapin baumier ++
- bouleau bl +
- Sarrle

- Lichen
- chiogène
- limet bovale -

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 28 juin 2007

Station 47

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
										Arbo. bas	Arbo. moy.	Arbo. haut	Arbo. bas	Arbo. haut			
Regeneration mixte	75%	25%	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0			

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

Regeneration mixte à dominante coniférienne (104m de hauteur)
 {
 -> Sapin baumier ++
 -> bouleau bl +
 -> épinette rouge +

- Clinohie
- Ribes
- 4 temps
- diogone hispide
- linnee borale

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 15 juin 2007

Station 48

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
Forêt mixte	60%	40%	0	0	3/0	2	3	1	0	0	1	1	1	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

Regénération (1 d 2 m) = forêt épaisse (7,8 m)
 { - Epinette rouge
 - Sapin baumier
 - quelques trembles
 - bouleau blanc

- The du Labrador
 - 4 temps
 - lichens
 - chiogène

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 15 juin 2007

Station 49

Habitat	Superficie (%)				Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.		Humide marais						Eau	Ouv.	Musc.	Herba.		Arbu.		Arbo. bas	Arbo. haut
												basse	haute	bas	moy.		
Forêt mixte	60%	40%	0	0	0	2	3	2	1	0	0	1	1	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Seme regeneration (1 à 2 m) quelques épaves → 10m
 { Sapin baumier +++
 Epinette rouge
 bouleau bl.

- Rube
- triviale
- Rubus
- 4 temps

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 50

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Forêt conifère	80%	10%	0	0	10%	4/2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Forêt conifère (5 à 10 m)
- Epimette
- boudot blanc
- Epimette rouge
- Ribes
- Rubus

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 51

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Humide		Eau						Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
	Conif.	Feuil.	marais														
forêt conifère	90%	5%	0	5%	0	3/4	2	2	1	1	0	0	0	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt conifère mature
- { - sapin baumier + + +
- bouleau bl
- oxalide de montagne
- trientalis boréale
- Maianthemum
- linnaea boréale
- sphéque

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 52

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Humide marais		Eau Ouv.						Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.												
Forêt mixte conifère	40%	10%	0	0	50%	0/3	1	2	1	1	1	0	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Forêt mixte à dominante coniférienne (+ régénération -)
- Épicéa rouge
- Sapin baumier +
- Bouleau bl
- Cornouiller 4 temps
- Chioyène
- Herbe du Labrador
- Lichen

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 53

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
Forêt mixte	40%	60%	0	0	1/2	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Forêt mixte (régénération 1 à 3 m)
- Bouleau blanc + + +
- Sapin baumier + +
- 4 temps
- Frambesia

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 18 juin 2007

Station 54

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau					Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
lisière	65%	5%	0	0	30%	4%	0	1	1	1	1	1	1	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Forêt conifère
 { - Epinette rouge
 - Sapin baumier
 - bédard blanc

- Lavigne
 - 4 temps
 - Rubus

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 4 juillet 2007

Station 55

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
1.106 conifera	75%	10%	5%	0	0/4	2	1	4	1	1	1	1	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt mature conifère et régénération (1m)
 - ↳ (supin 8m) } bouleau bl ++ +
 - ↳ (épicéa) } sapin baumier

Ribes
- H:emps

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date : 19 juin 2007

Station 56

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
lisière	55%	5%	0	0	40%	4	2	1	1	0	0	0	1	1			

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- lisière = forêt conifère mature à régénération mixte
 - Epinette +++
 - Sapin banane +
 - bouleau blanc
- Linnaé
- Chiogène
- Haïontheine

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 19 juil 2007

Station 57

Habitat	Superficie (%)			Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
forêt conifère lisière	50%	10%	0	0	3/5	3	3	1	1	0	0	0	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
 Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
 Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
 Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• lisière forêt conifère régénération bouleau blanc (1m)
 - Epineux ++ (8 à 10m)
 - bouleau blanc

- 4 Temps
 - lisière brouillard

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 19 juin 2007

Station 58

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Ouv.	Eau	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
regeneration mixte	50%	50%	0	0	4	2	1	2	1	1	0	0	0	1	0		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Regénération forêt mixte (A à 4 m)
 } - bouleau blanc ++
 } - sapin baumier ++
 - Fougère
 - Linnee boreal

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

19 juin 2007

Station 59

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
	40%	40%	0	0	20%	2	3	1	1	1	1	1	0	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Forêt conifère mature × Régénération (1m)
↳ bouleaux blanc.
↳ épinette

- 4 temps
- arbustes

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 19 juin 2007

Station 60

Habitat	Superficie (%)			Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Forêt conifère	50%	10%	0	0	60%	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère),lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Forêt coniférienne mature (10 m) & régénération
 - Epinette ++
 - Sapin baumier ++
 - bouleau blanc
- Rubus
- 4 Temps -
- dracogène
- Linnaé
- Lichen

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 21 juin 2007

Station 121

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Humide marais		Eau Ouv.						Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
	Conif.	Feuil.	Humide	Eau												
feu	45%	50%	0	0	50%	4	5	1	0	0	0	0	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère),lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• lisière forêt marne. et régénération (8m) lisière épave (8m) lisière sapin baumier - bouleau blanc

• diogène
 lisière bordée
 - cornouille 4 imp.
 lichen

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 21 juin 2007

Station 62

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
lisière	35%	15%	0	0	50%	0/3	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération forêt mixte + quelques grandes épinettes (10m)
 - ↳ (10 à 20 m) { - bouleau blanc ++
 - sapin baumier +
 - épinette rouge
- Rubus
- ↳ 4 types
- saules
- tremble

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 21 juin 2007

Station 63

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates											
	Conif.		Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut		
forêt conifère	85%	15%	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- régénération (à 4 m) v forêt coniférienne mature (10 à 12 m)
- f. Sapin Baume blanc
- Epinette rouge
- bouleau blanc
- hampes
- mianbélène
- chryse hispide
- Linnaea borealis
- Ribes
- Oxalide de montagne

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 21 juin 2007

Station 64

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
lisière	60%	10%	0	0	1/4	0	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Forêt coniférienne mature & régénération
 - ↳ Epinette
 - ↳ Hêtre
 - ↳ Sapin
 - ↳ Tremble
- saule
- érable
- hêtre
- sapin
- érable

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 21 juin 2007

Station 65

Habitat	Superficie (%)				Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Humide marais		Eau Ouv.						Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.												
mixte sûr conifère	65%	5%	0	0	30%	0/5	1	2	3	1	1	1	0	0	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Régénération (1 à 2 m) + forêt mature (8m)
 1. Epine de rouge + 1 Epine de
 Sapin baumier +
 Bouleau blanc
 - Linde boréale
 - Cornouiller à fleurs ps
 - Rubus
 - Lilien

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 22 juin 2007

Station 66

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
Ouv. vert	8%	12%	0	0	80%	1	0	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère),lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération (1 à 2 m) (4 m)
 - Sapin ban mi +
 - Bouleau blanc ++ +
 - tremble
 - Saule
 - Rubus
 - 4 temps

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 22 juin 2007

Station 67

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
lisière	40%	20%	0	20%	0/3	0	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Proche les laies, forêt mature & régénération
 - ↳ épinette
 - ↳ mixte { - bouleau blanc + + +
 - sapin baumier +
 - hémlock
 - épinette rouge
- limnée barade
- h temps
- :aube

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

22 juin 2007

Station 68

Habitat	Superficie (%)				Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
lisière forêt conifère	70%	5%	0	0	25%	0/5	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. moda : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Lisière Forêt mature coniférienne x végétation -
 - lichen
 - diogone
 - comoulier 4 temps
 - Rubus
 - Linnaea boreale -
- Lisière Forêt mature coniférienne x végétation -
 - sapin baumier ++
 - épine de rouge
 - bouleau blanc +

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 22 juin 2007

Station 69

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
lisière	65%	10%	0	0	25%	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale. 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Lisière forêt mature x jeune régénération
- 4 sapin baumier
- épinette rouge
- bouleau blanc
- limbé
- 4 fougères
- Fougère
- mûras

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 22 juin 2007

Station 70

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Humide marais		Ouv.						Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
	Conif.	Feuil.	Eau	Ouv.												
Lisière	30%	10%	0	0	60%	0	1	3	1	1	1	0	0	0	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Lisière régénération & forêt mature mixte
 Lisière : sapin baumier + 1 sapin baumier
 Lisière : bouleau blanc + 1 sapin baumier
 Lisière : épinette rouge
 Lisière : épinette
 Lisière : 4 temps
 Lisière : liban

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 23 juin 2007

Station 71

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
lisière	15%	5%	0	0	50%	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Régénération
 45-bouleau blancs }
 - sapin baumiers }
 - hêtre boréal }
 - 4 hêtres }
 - rube }
 - forêt conifère mature }
 45-épinette }
 - sapin }
 - bouleau }

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 23 juin 2007

Station 72

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
lisière	30%	10%	0	0	60%	0	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération (1m) forêt mature (5 à 10m)
 - Bouleau blanc ++
 - Sapin baumier - épinette rouge
 - Pice
 - Pinne locale

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 23 juin 2007

Station 73

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
Regeneration	20%	20%	0	0	0	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération - bouleau bl (1m) - 1-1-1
- épinette - 1-1
- Sapin baume - 1
- forêt mature
- 1 épinette
- 1 sapin baume

- Lioulé

- 4 temps

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 23 juin 2007

Station 74

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Forêt mixte	65%	5%	0	0	0/3	0	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30cm), arbrustes bas (<0.5 m), arbrustes moyens (0.5 à 2 m), arbrustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt conifère mature x jeune régénération
- ↳ - Sapin baumier
- Épicéa rouge
- bouleau blanc
- Rible
- Linnet borde
- Mésange
- F. orange
- ... etc

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 23 juin 2007

Station 75

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Regénération mûre	80%	5%	0	0	15%	1/3	3	0	1	0	0	0	0	1	1		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), listière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Régénération carpele (2 à 5 m) x forêt mature (10 m)
 ↳ sapin baumier
 ↳ bouleau blanc
 ↳ épinette
 ↳ sapin baumier

- rubus
 - champignons
 - l'année froide
 - fougère
 - mousses
 - orchidée

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

24 juin 2007

Station 76

Date:

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
forêt	25%	70%	0	5%	50%	0	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• forêt mature coniférienne à régénération -
 U. sapin
 Epinette
 Le bouleau blanc

rubus

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 22 juin 2007

Station 77

Habitat	Superficie (%)				Vis. moda.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Lisière	50%	20%	0	0	0/4	0	2	3	1	1	1	1	1	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. moda : Visibilité modale. 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Regeneration x forêt mature
- ↳ Sapin baumier
- tremble
- Épinette

- 4 temps
- Ribes
- Fougère
- mûres
- oxalide

↳ Sapin baumier - épinette

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 24 juin 2007

Station 75

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
lisière	30%	70%	0	0	30%	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest. insect. : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- lisière : régénération à forêt mature
 -> bouleaux blancs + l'épinette
 - sapin baumier + sapin
- arbres
- 4 types
- lisière ouverte
- eau

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 24 juin 2007

Station 79

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
lisière	60%	20%	0	0	1/5	0	1	3	1	1	1	1	1	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie de divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale. 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération (20 ha) à forêt mixte
- U. Sapin baumier
- bouleau blanc
- épinette rouge
- rubus
- Linnaea borealis
- mianthe
- 4 temps

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 24 juin 2007

Station 80

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
forêt mature	70%	10%	0	0	20%	1/4	0	4	1	1	0	0	0	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt mature x régénération (bord du chemin)
- Li. épinette
- Li. bouleau blanc ++
- épinette
- sapin
- hêtre
- rhus
- c. roux rouge
- saule

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 16 juin 2007

Station 61

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.		Humide marais						Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
épinédo conifère	60%	0	0	0		2	2	2		1	0	0	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération conifère
- { Sapin baumier
- } bouleau blanc
- Rive
- 4 Temp
- fougère
- framboisier
- pin
- m acanthaire

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 16 juin 2007

Station 82

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
lisière	25%	15%	0	0	60% ^{0/4}	2	3	4	1	1	1	1	0	1	1	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).
Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.
Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).
Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).
Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).
Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- forêt mature - coupe forestière
- { - épinette ++ +
- sapin baumier
- bouleau blanc ++
- saules
- rubus (ramboisier)
- sureau rouge
- triantale boréale +

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 16 juin 2007

Station 83

Habitat	Superficie (%)					Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates						
	Humide marais		Eau	Ouv.	Musc.					Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
	Conif.	Feuil.														
lisière	30%	40%	0	0	30%	4	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Lisière en bordure de forêt mixte -
 - { épiphyte ++
 - { bouleau blanc ++ (rejets 1m)
- saules
- microréole
- framboisier
- ribe
- fougère

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 16 juin 2007

Station 84

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Mixte	50%	45%	0	0	5%	1/4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération (forêt coniférienne mature à l'arrière)
 - { sapin baumier +++
 - { bouleau bl ++
 - { épinette rouge
- Saules

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 3 juillet 2007

Station 85

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
regeneration mixte	50%	30%	0	0	20%	/	2	4	1	1	1	1	1	1	0		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. modale : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

● Régénération forêt mixte à dominante conifère

{ : sapin baumier ++
: bouleau blanc ++
: tremble +

- rubus
- fougère

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 24 juin 2007

Station 86

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau					Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
regénération mixte	45%	45%	0	0	10%	2/5	1	2	1	1	1	1	1	1	0		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Régénération mixte (1 à 3 m)
 L₁ - sapin baumier
 - bouleau blanc
 - épinette rouge
 (- saule)

- Fougère

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 7 juillet 2007

Station 87

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Humide		Eau					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut	
	Conif.	Feuil.														marais
lisière	25%	5%	0	0	70%	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. modale : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest. insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- lisière forêt coniférienne mature à coupe à blanc
- ↳ sapin baumier +++
- épinette ++
- bouleau blanc

- rebus
- 4 kempes
- fougère
- Clintonie

↳ régénération sapin baumier (50cm à 1m) + bouleau blanc

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 7 juillet 2007

Station 88

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates									
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau	Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Ouvet	15%	5%	0	0	80%	1	4	1	1	1	1	1	1	1			

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. modale : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

• Lisière forêt coniférienne mature (6 à 10m) x jeune régénération (50cm à 1m50)

↳ sapin baumier

- épinette

↳ bouleau blanc ++

- sapin baumier +

- 4 temps

- Clinchomé

- rubus

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 7 juillet 2007

Station 89

Habitat	Superficie (%)			Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates								
	Conif.	Feuil.	Humide marais					Eau Ouv.	Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbo. bas	Arbo. haut
Régénération mixte	00%	30%	0	10%	1/5	2	0	1	1	1	1	1	1	0		

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod. : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombres de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence), Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Régénération forêt mixte (2 à 4 m haut)
 - Sapin baumier ++ +
 - épinette
 - bouleau blanc ++
 - Saule +

DESCRIPTION DE L'HABITAT GRIVE DE BICKNELL

Date: 7 juillet 2007

Station 90

Habitat	Superficie (%)				Vis. mod.	Infest. insect.	Chicots	Souches	Strates							
	Conif.	Feuil.	Humide marais	Eau Ouv.					Musc.	Herba. basse	Herba. haute	Arbu. bas	Arbu. moy.	Arbu. haut	Arbu. bas	Arbu. haut
Lisière	30%	10%	0	0	60%	0/4	3	4	0	1	0	0	0	1	0	

Habitat : Type d'habitat selon nos critères : coniférien (75% et + superficie coniférienne), feuillu (75% et + superficie feuillue), mixte (25 à 75% de feuillu ou de conifère), lisière (30 à 70% de superficie forêt + 30 à 70% superficie ouverte), ouvert (80% de superficie ouverte).

Superficie : Pourcentage de superficie des divers milieux.

Vis. mod : Visibilité modale, 0 (milieu ouvert), 1 (bonne 100 m), 2 (assez bonne 50-100 m), 3 (moyenne 20-50 m), 4 (faible 8-20 m), 5 (très faible 2.5 à 8 m), 6 (nulle - de 2.5 m).

Infest insect : Indice d'infestation d'insectes : 0 (nul), 1 (faible), 2 (fort).

Chicots : Nombre, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Souches : Nombre de souches ou de troncs renversés, 0 (0), 1 (1-5), 2 (6-25), 3 (25-100), 4 (+ de 100).

Strates : 0 (absence) et 1 (présence). Musc (plantes muscinales), herbacées basses (<30 cm), herbacées hautes (>30cm), arbustes bas (<0.5 m), arbustes moyens (0.5 à 2 m), arbustes hauts (2 à 5 m), arbres bas (5 à 15 m), arbres hauts (>15 m).

Notes diverses (espèces dominantes, observations importantes, etc):

- Pénombre totale. Mixte. Régénération mixte (4m) à régénération complète (3 à 4m)
- Sapin baumier
- bouleau blanc
- ↳ quelques bouleaux blancs

- Clintonie
- 4 Temps
- Fougère