Figure 7

INVENTAIRE DU MILIEU BIOPHYSIQUE



SEGMENT RIVERAIN

Segment (N°)	Granulométrie	Pente de la rive	Pente de la berge
1	BG	> 30°	10-30°
2	RGL	10-20°	< 10°
3	BS	10-30°	10°
4	BSG	< 5°	< 5°
5	BGR	> 40°	5°
6	BBxG	1°	5°
7	CGSB	< 5°	< 5°
8	BBxG	20-30°	10°
9	SV	10-30°	5°
10	VCG	< 5°	< 5°
11	CGV	10-30°	5°
12	GBS	10-20°	5°
13	R	20°	20°
14	BG	5-10°	5-10°
15	BG	20-30º	5-10°

GRANULOMÉTRIE

S	Sable
V	Gravier
C	Callou
G	galet
B	bloc
Bx	bloc métrique

FRAYÈRE CONNUE

CACA	Meunier rouge
CACO	Meunier noir
ESLU	Grand brochet
ICNE	Barbotte brune
PEFL	Perchaude
STCA	Doré
STVI	Doré noir

FAUNE

- Frayères à doré, meunier et barbotte brune
- Frayère connue
- Colonie de castors
- \ 1 / Segment homogène de rive
- Sens d'écoulement

- Feuillus intolérants
- Peuplement mixte à dominance de feuillus
- Peuplement mixte à dominance de résineux
- Urbain
- Érosion des berges

DÉPÔT DE SURFACE

- **GS** Till indifférencié mince
- **R** Roc
- **AR** Dépôt glacio-lacustre (sable et gravier)

INFRASTRUCTURE

- 391 Route principale
- Route secondaire



GROUPE CONSEIL GENIVAR

M96531