




Les activités fauniques au Bas-Saint-Laurent (données 1999)

Nombre de participants à la pratique d'activités reliées à la nature (avec ou sans prélèvement)	335 778
Participants aux activités directement reliées à la faune (en tant qu'activité principale)	92 934
Nombre de sorties pour la pratique d'activités reliées à la nature	1 682 240
Nombre moyen de sorties par participant	6,7
Nombre moyen de sorties pour des activités reliées à la faune (en tant qu'activité principale)	7,4













La biodiversité des communautés de poissons comme outil d'évaluation de l'intégrité du milieu aquatique

	Bon	Moyen	Faible
Métriques	10	5	0
1. % d'individus d'eau froide	> 4	4-1	0
2. % d'individus d'eau chaude	0	1	> 1
3. Classes de taille d'omble de fontaine	Jeunes présents	Adultes seulement	ABSENT
4. % d'individus tolérants	< 11	11-33	> 33
5. % de cyprinidés invertivores	> 56	56-29	< 29
6. % DELT	SI ≥ 2 % soustraire 5 points de l'IIB		










Importance écologique comme source alimentaire pour les poissons, oiseaux et mammifères marins


Importance économique comme espèce pour la pêche sportive sur la glace et sur les quais







Riviere Fouquette, 2002-06-08

La conservation de cette frayère passe par une amélioration de la qualité de l'eau et une réduction à la source des polluants



Évolution du nombre d'unités animales dans le bassin versant de la rivière Fouquette

Année	Laitier	Bovin	Porcin	Ovin	Total
1997 =	1727	819	171	118	2851



Une action concertée pour la protection et la mise en valeur
des ressources à l'échelle du bassin versant



La prise en compte du maintien de la biodiversité
est essentielle dans le cadre d'une agriculture
répondant aux critères du développement durable

