

# Répertoire des connaissances sur le fleuve Saint-Laurent

**220**

**DB15**

•Projet d'aménagement de la promenade Samuel-De Champlain entre le pont Pierre-Laporte et la côte de l'Église à Québec

Québec

6211-23-005



Ressources naturelles  
et Faune

Québec 

# Mandat du secteur Faune Québec

- Faune et habitats
- Conservation
- Mise en valeur
- Développement durable et harmonieux

# Législation

- Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1)
- Règlement sur les habitats fauniques (L.R.Q., c. C-61.1, r. 0.1.5)
- Règlement de pêche du Québec (DORS/90-214)

# Secteur décrit



# Habitat du poisson

- Tenure publique
  - Règlement sur habitats fauniques (Faune Québec)
  - Loi sur les pêches (Pêches et Océans Canada)
- Tenure privée
  - Loi sur les pêches (Pêches et Océans Canada)

# Échantillonnage 2005

- Pêche expérimentale
- Enquête de pêche



# Pêche expérimentale

- Juin et août
- Marée haute et marée basse
- Filets maillants
- Seine de rivage



# Aux filets maillants

développons

conservons

conservons

développons

protégeons

protégeons



# Doré noir (*Sander canadensis*)

- 38 % des captures



protegeons

# Doré jaune (*Sander vitreus*)

- 10 % des captures



protegeons

# Barbue de rivière (*Ictalurus punctatus*)

- 6 % des captures



# Esturgeon jaune (*Acipenser fulvescens*)

- 4 % des captures




# Perchaude (*Perca flavescens*)

- 4 % des captures



# Bar rayé (*Morone saxatilis*)

- 1 % des captures



# Les autres espèces sportives

- Alose savoureuse (*Alosa sapidissima*) 2 %
- Achigan à petite bouche (*Micropterus dolomieu*) 1 %
- Crapet de roche (*Ambloplites rupestris*) 1 %
- Grand brochet (*Esox lucius*) 1 %
- Grand corégone (*Coregonus clupeaformis*) 1 %

# Les autres espèces


- Chevalier rouge (*Moxostoma macrolepidotum*) 21 %
- Meunier noir (*Catostomus commersoni*) 7 %
- Meunier rouge (*Catostomus catostomus*) 2 %
- Ouitouche (*Semotilus corporalis*) 1 %



# À la seine de rivage

- Gobie à taches noires (*Neogobius melanostomus*)
  - Plus de 50 % des captures en biomasse
- Catostomidés (larves et juvéniles)
- Percidés (larves et juvéniles)
- Cyprinidés

# Le potentiel de pêche aux dorés



# Enquête de pêche

- Enquête sur les quais et le rivage
- Période du 2 juillet au 14 août
- Marée haute et marée basse
- Prépondérance des fins de semaine

# Utilisation des quais

- Par estimation
  - 3349 heures de pêche (2484 – 4215) (i.c. 95 %)
- Trois sites utilisés
  - Quai Irving 63 %
  - Côte de l'Église 27 %
  - Anse Brown 10 %

# Utilisation des quais



# Pêche commerciale à l'anguille



**Merci de votre attention !**



*Ressources naturelles  
et Faune*

**Québec** 