

ANNEXE 4.4

**Liste partielle des espèces de poissons signalées dans la zone d'étude
(secteur Québec – Lévis)**

<p>O. PETROMYZONIDIDA F. <i>Petromyzontidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ichthyomyzon fossor</i>, Lamproie du Nord - <i>Ichthyomyzon unicuspis</i>, Lamproie argentée - <i>Lampreta appendis</i>, Lamproie de l'est - <i>Petromyzon marinus</i>, Lamproie marine <p>O. ACIPENSERIDA F. <i>Acipenseridae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acipenser fulvescens</i>, Esturgeon jaune^{V2000QUE} - <i>Acipenser oxyrhynchus</i>, Esturgeon noir^{V2000QUE} <p>O. SEMIONOTIDA F. <i>Lepisosteidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lepisosteus osseus</i>, Lépisosté osseux <p>O. AMIIDA F. <i>Amiidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amia calva</i>, Poisson-castor <p>O. OSTEOGLOSSIDA F. <i>Hiodontidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hiodon tergisus</i>, Laquaiche argentée <p>O. ANGUILLIDA F. <i>Anguillidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Anguilla rostrata</i>, Anguille d'Amérique^{V2000QUE} <p>O. CLUPEIDA F. <i>Clupeidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Alosa pseudoharengus</i>, Gaspereau - <i>Alosa sapidissima</i>, Alose savoureuse^{V2000QUE} - <i>Dorosoma cepedianum</i>, Alose à gésier <p>O. CYPRINIDA F. <i>Cyprinidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Carassius auratus</i>, Carassin* - <i>Cyprinus carpio</i>, Carpe - <i>Hybognathus nuchalis</i>, Méné d'argent - <i>Notemigonus crysoleucas</i>, Méné jaune - <i>Notropis atherinoides</i>, Méné émeraude - <i>Notropis cornutus</i>, Méné à nageoires rouges - <i>Notropis hudsonius</i>, Queue à tache noire - <i>Notropis stramineus</i>, Méné paille - <i>Semotilus atromaculatus</i>, Mulet à cornes - <i>semotilus corporalis</i>, Ouitouche - <i>Semotilus margaritas</i>, Mulet perlé 	<p>F. <i>Catostomidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Carpoides cyprinus</i>, Couette - <i>Catostomus catostomus</i>, Meunier rouge - <i>Catostomus commersoni</i>, Meunier noir - <i>Moxostoma anisrum</i>, Suceur blanc - <i>Moxostoma macrolepidutum</i>, Suceur rouge - <i>Moxostoma valenciennesi</i>, Suceur jaune <p>O. SILURIDA F. <i>Ictaluridae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ictalurus nebulosus</i>, Barbotte brune - <i>Noturus flavus</i>, Barbotte des rapides - <i>Ictalurus punctatus</i>, Barbut de rivière - <i>Noturus gyrinus</i>, Chat-fou brun <p>O. SALMONIDA F. <i>Esocidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Esox lucius</i>, Grand Brochet - <i>Esox masquinongy</i>, Maskinongé - <i>Esox niger</i>, Brochet maille <p>F. <i>Osmeridae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Osmerus mordax</i>, Éperlan arc-en-ciel <p>F. <i>Salmonidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Coregonus artedii</i>, Cisco de lac - <i>Coregonus clupeaformis</i>, Grand Corégone - <i>Oncorhynchus tshawytscha</i>, Saumon Chinook - <i>Salmo mykiss</i>, Truite arc-en-ciel* - <i>Salmo salar</i>, Saumon atlantique - <i>Salmo trutta</i>, Truite brune* - <i>Salvelinus namaycush</i>, Touladi - <i>Salvelinus fontinalis</i>, Omble de fontaine <p>O. PERCOPSIDA F. <i>Percopsidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Percopsis omiscomaycus</i>, Omisco <p>O. CYPRINODONTIDA F. <i>Cyprinodontidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fundulus diaphanus</i>, Fondule barré <p>O. GADIDA F. <i>Gadidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lota lota</i>, Lotte - <i>Microgadus tomcod</i>, Poulamon atlantique^{V2000QUE} 	<p>O. Gasteosteida F. <i>Gasterosteidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Apletes quadracus</i>, Épinoche à quatre épines - <i>Gasterosteus aculeatus</i>, Épinoche à trois épines - <i>Gasterosteus wheatlandi</i>, Épinoche tacheté - <i>Pungitius pungitius</i>, Épinoche à neuf épines <p>O. SCORPAENIDA F. <i>Cottidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cottus bairdi</i>, Chabot tacheté - <i>ricei</i>, Chabot à tête plate <p>O. PERCIDA F. <i>Percichthyidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Morone americana</i>, Baret - <i>Morone chrysops</i>, Bar blanc - <i>Morone saxatilis</i>, Bar rayé^{V2000QUE} <p>F. <i>Centrarchidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ambloplites rupestris</i>, Crapet de roche - <i>Lepomis gibbosus</i>, Crapet-soleil - <i>Lepomis macrochirus</i>, Crapet Arlequin - <i>Micropterus dolomieu</i>, Achigan, à petite bouche - <i>Micropterus salmoides</i>, Achigan à grande bouche - <i>Pomoxis nigro maculatus</i>, Marigane noire <p>F. <i>Percidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eutheostoma nigrum</i>, Raseux-de-terre-noir - <i>Perca flavescens</i>, Perchaude - <i>Stizostedion canadense</i>, Doré jaune - <i>Stizostedion vitreum</i>, Doré noir - <i>Percina caprodes</i>, Fouille-roche <p>F. <i>Sciaenidae</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aplodinotus grunniens</i>, Malachigan <p>O. PLEURONECTOFORME F. <i>Pleuronectidae</i></p> <p><i>Liopsetta putnami</i>, Plie lisse</p> <p>Autre</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Neogobius melanostomus</i>, Gobie à tache noire
---	--	--

Source : Mousseau, P. et A. Armelin. 1995; Aquarium du Québec et le Centre Saint-Laurent d'Environnement Canada résultats de pêche aux filets au pont Québec de 1990 à 2000; FAPAQ, 1974, résultats de pêche effectuée à la seine et au filet dans la zone d'étude; M. Joseph Paquet, résultats de pêche commerciale effectuée à la pêche à la fasine dans le secteur de l'Anse Saint-Michel et de la Pointe-à-Puiseaux.

Les noms suivis d'une astérisque désigne des espèces non indigènes au Québec.

Les noms suivis du sigle V 2000 désignent des espèces prioritaires du plan d'action Saint-Laurent Vision 2000 (Bouchard et Millet, 1993)

Les noms suivis du sigle QUE désignent des espèces de la liste vertébrés prioritaires du Québec, Espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables (MLCP, 1992b)

